

DELTRIN

**COMPOSIZIONE:**

DELTAMETRINA pura g. 1,51
(= 15,7 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FORMULAZIONE:

Sospensione concentrata

CONFEZIONI:

500 ml. - 1 L

COLORAZIONE:

Non colorato

CLASSIFICAZIONE:

Non classificato

MISCIBILITA':

Il prodotto non è miscibile con
antiparassitari a reazione alcalina.

TEMPO DI CARENZA:

7 gg. cipolla, sedano, porro

15 gg. soia, cotone, erba medica

30 gg. colza

3 gg. altre colture

REGISTRAZIONE:

n. 10976 del 12.07.2001

Insetticida in sospensione concentrata

DELTRIN è un insetticida piretroide in sospensione concentrata che agisce per contatto ed ingestione. La mancanza di solventi e la bassa tossicità ne rendono l'impiego particolarmente adatto in serra e nelle colture protette. Risulta dotato di un ampio spettro di azione insetticida e manifesta ottima capacità di protezione delle colture anche a basse temperature. L'effetto repellente ne prolunga la durata di azione, ostacolando la reinfestazione.



manica[®]

DELTRIN

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO



AGRUMI: contro Afidi, Aleurodidi, Mosca degli agrumi, Cocciniglie alla dose di **75-120 ml/hl**



FRUTTIFERI (Melo, Pero, Albicocco, Pesco, Ciliegio, Susino, Mandorlo):

- contro Psilla del pero alla dose di 120-130 ml/hl
- contro neanidi di Cocciniglia S.Josè in trattamenti estivi alla dose di 90-130 ml/hl
- contro Cidia e Anarsia alla dose di 90-120 ml/hl
- contro Microlepidotteri minatori del melo e del pero alla dose di 70-100 ml/hl
- contro Afide verde del melo, Afide del pesco, Capua, Cacoecia, Carpocapsa, Antonomo, Maggiolini, Tentredine, Tripidi, Mosca della frutta alla dose di 70-100 ml/hl.



VITE: contro Tignole alla dose di **75-120 ml/hl**, contro Cicaline, Afidi, Sigaraio, Nottue, Piralide alla dose di **60-90 ml/hl**.



OLIVO: contro Mosca dell'olivo, Tignola dell'olivo, Cocciniglia m. g. di pepe, Tripide alla dose di **75-120 ml/hl**.



ASPARAGO, CAVOLI, CAROTA, CETRIOLO, CIPOLLA, FAGIOLO, FAGIOLINO, FAVA, FRAGOLA, LATTUGHE E SIMILI, RUCOLA, MELANZANA, PATATA, PISELLO, PORRO, POMODORO, PEPERONE, SEDANO, SPINACIO: contro Afidi, Aleurodidi, Cimici, Casside, Criocera, Piralide, Dorifora, Cavolaia, Altiche, Nottue, Tentredini, Tripidi, Mosca e Depressaria alla dose di **75-90 ml/hl (0,75-0,9 l/ha)**.



FRUMENTO, ORZO, MAIS: contro Piralide, Diabrotica del mais, Afidi, Nottue, Tripidi alla dose di **0,6-0,9 l/ha**

SOIA, COLZA: contro Altiche, Afidi, Cimici, Punteruolo, Nottue, Meligete, Tortricidi alla dose di **0,6-0,9 l/ha**

COTONE: contro Cicalina, Nottue, Piralide, Tripidi, Lygus alla dose di **0,6 l/ha**

ERBA MEDICA: contro Nottue, Misurino alla dose di **0,7-0,8 l/ha**.



BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Altica e Nottue alla dose di **0,5-0,6 l/ha**; contro Lisso e Cleono alla dose di **0,9-1 l/ha**

TABACCO: contro Afidi, Tripidi, Nottue, Epitrix alla dose di **0,7-0,9 l/ha**.



PIOPPO: - in vivaio contro Tarlo vespa e Gemmaiola alla dose di **100 ml/hl**; in interventi localizzati al tronco contro Criptorinco **160-170 ml/hl** - in pieno campo contro Crisomelidi defogliatori alla dose di **50-90 ml/hl**; contro Criptorinco ed in interventi localizzati al tronco **130-200 ml/hl**; contro Saperda maggiore **280-350 ml/hl**.

FLOREALI: in campo ed in serra contro Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Tortricidi alla dose di **70-120 ml/hl**; contro Bega del garofano **90-160 ml/hl**

ORNAMENTALI E VIVAI: in campo ed in serra contro Afidi, Tingide, Cimice del Platano, Maggiolino, Cetonia, larve di lepidotteri alla dose di **85-100 ml/hl**.

FUNGHI COLTIVATI: contro Ditteri e Collemboli alla dose di **60-90 ml/hl**.



* vedi nota in indice.